

NADLEŚNICTWO KOLBUSZOWA

W

WOJEWÓDZTWIE

PODKARPACKIM

NADLEŚNICTWO KOLBUSZOWA



Nadleśnictwo Kolbuszowa powstało 29.12.1977r. Składa się z trzech obrębów:

- obręb w Kolbuszowej znajdujący się na terenie starego województwa rzeszowskiego,
- obręb Morgi także na obszarze dawnego województwa rzeszowskiego,
- obręb Nart położony na miejscu dawnego województwa tarnobrzeskiego.

Fragment obrębu Kolbuszowa przekazano do Nadleśnictwa Buda Stalowska. Od 01 stycznia 1991r. ziemie w obrębie Nart włączono do obrębu Morgi.

ZWIERZĘTA NASZYCH LASÓW

W powiecie kolbuszowskim żyje mnóstwo rozmaitych gatunków zwierząt. Dziś chciałobyśmy przybliżyć Wam kilka gatunków ssaków z okolic Kolbuszowej. Oto kilka z nich:

- bóbr europejski
- dzik
- zając szarak
- sarna europejska
- jelenź szlachetny
- lis pospolity
- wiewiórka ruda
- wilk szary.

BÓBR

Bobry są drugą co do wielkości rodziną gryzoni na świecie; największe są kapibary. W Polsce obecnie występuje jedynie rodzimy gatunek, czyli bóbr europejski. Bóbr jest ssakiem ziemno-wodnym. Żyje do 20 lat. Mieszka w pobliżu rzek lub w żeremiach.

ZAPAMIĘTAJ!

Bobry są pod ochroną!
Bobry należą do gryzoni, podobnie jak np. mysz czy szczur.
Dzięki bobrom budującym tamy i żeremia chronione są miejscowe ekosystemy wodne – naturalne środowisko życia wielu roślin i zwierząt.
Ogon bobra w gwarze łowieckiej nazywa się pluskiem.

CZY WIESZ, ŻE...?

Bóbr sygnalizuje zagrożenie, silnie uderzając ogonem w wodę. Dźwięk ten jest słyszany nawet na odległość 1 km.
Gdy małe bobry nie mają sił płynąć, matka popycha je jak łódki po wodzie.
W dawnej Polsce bobry były cenione ze względu na mięso i futra, którymi płacono. Bobry były własnością króla, który ustanowił nawet straż bobrownicką pilnującą, by nie polowali na nie kłusownicy.
W średniowieczu uważano bobry za ryby, dlatego ich mięso jedzono w poście.

Dzik występował w całej Europie, Azji i północnej Afryce. Jest jedynym przedstawicielem rodziny świniowatych w Polsce. Należy do zwierzyny łownej, podlega czasowej ochronie. Jego udomowioną formą jest świnia domowa.

DZIK



Młode dzika to warchlaki. Samica, czyli locha jest prawie o połowę mniejsza od samca, czyli odyńca. Dziki jedzą: orzechy bukowe, żołądź, grzyby i rośliny. Czy wiesz, że dziki tarzają się w błocie, stąd ich sierść ma kolor ziemi występujący na obszarze, gdzie żyją.

Na terenie Województwa Podkarpackiego popularnym gatunkiem jest zając szarak. Chroniony jest jedynie w okresie rozrodu, wiosną i latem. Obecnie liczba zajęcy maleje.

Zając szarak jest niewielkim zwierzęciem, ma maksymalnie 75cm i wysokość około 30 cm . Waży do 6kg .

Tylne nogi ma przystosowane do skakania. Posiada długie uszy, dzięki którym doskonale słyszy. Ma krótki, biały od spodu ogon zwany omykiem. Przednie zęby są długie i ostre. Charakterystyczna u zajęcy jest ruchoma i rozdwojona górna warga. Co ciekawe króliki potrafią poruszać nozdrzami.

ZAJĄC SZARAK

CZY WIESZ, ŻE...?

W gwarze myśliwskiej nogi zająca to skoki, uszy – słuchy, oczy – trzeszcze, ogon – omyk, a sierść – turzyca. Zając rzadko pije wodę, najczęściej wystarcza mu woda z roślin i pokrywającej je rosy.

Zając jest tak płochliwy, że nie można go hodować. Najmniejszy ruch go płoszy, a uciekając w popłochu, może się zabić o ogrodzenie lub najbliższą przeszkodę.

Zające źle znoszą wilgoć, dlatego w deszczowych latach wiele z nich, zwłaszcza małych, ginie.

W okresie zalotów zające i zajęczyce boksują się z sobą.

Sarna europejska należy do rodziny jeleniowatych. Są parzystokopytne i roślinożerne. Występują w lasach całej Polski. Można ją spotkać na łąkach i polach, gdzie szuka pożywienia.

Jeleń szlachetny występuje we wszystkich typach lasów, także iglastych, lecz nie zbyt gęstych, ze względu na niebezpieczeństwo zaczepienia poroża. Może wychodzić także na łąki czy pola. Lubi miejsca podmokłe.

SARNA I JELEŃ

CZY WIESZ, ŻE...?

Aby zapewnić młodym jak najlepsze warunki życia po urodzeniu, czyli urodzić w maju lub czerwcu, gdy jest najwięcej pokarmu, sarny mają różną długość ciąży. Samice zapłodnione w lecie są w ciąży przez 10 miesięcy, a jesienią czy zimą 4-5 miesięcy. U tych pierwszych na pewien czas występuje zjawisko zatrzymania rozwoju płodu tak, aby wszystkie mogły urodzić w tym samym, najlepszym dla młodych czasie.

Jelenie robią ogromne szkody w uprawach i lasach, obgryzając pąki i korę drzew. Rośliny przez to nie kwitną, a drzewa nieosłonięte korą są atakowane przez szkodniki.

Jelenie śpią tylko około godziny na dobę.

ZAPAMIĘTAJ!

Sarna i jeleń to 2 różne gatunki zwierząt! Nie jest to – jak się często mylnie uważa – samica i samiec jednego gatunku. Znajdując w lesie czy na łące małe sarniátko czy jelonka, nawet, jeśli wydają się porzucone, nie zabieraj ich do domu ani nie dotykaj! Sarny i jelenie często ukrywają młode w trawie. Jeśli je dotkniesz, przekażesz swój zapach i rodzice, czując zagrożenie, zostawiają je i zapewne pozbawione opieki zginą. Samce jeleni i saren mają nie rogi (jak np. krowa czy żubr), ale poroże! Rogi rosną na całe życie, a poroże jest zrzucane i wyrasta nowe.

LIS



Lis, podobnie jak wilk, należy do rodziny psowatych. Istnieje 21 gatunków lisów. W Polsce występuje lis pospolity. Lis żyje do 15 lat. To zwierze jest bardzo wytrwałe i czujne. Lisy żyją parami lub w grupach. Mieszkają w prostych norach.

ZAPAMIĘTAJ!

Lisy roznoszą wściekliznę! To bardzo groźna choroba, dlatego gdy zobaczysz nawet małego i ślicznego liska, nie zbliżaj się do niego. Od dłuższego czasu w lasach rozrzuca się lekarstwo na tę chorobę, dlatego spadła liczba zachorowań wśród lisów, ale lepiej nie ryzykować.

Nigdy nie jedz niemytych jagód leśnych, gdyż bardzo często znajdują się na nich jaja bąblowca, który jest rodzajem tasiemca przenoszonego przez lisy. Możesz zarazić się bąblownicą; choroba ta prowadzi często do śmierci.

WIEWIÓRKA RUDA

Gatunek ten żyje w Europie i Azji. Występuje w lasach liściastych i iglastych całej Polski, można też ją spotkać w parkach i ogrodach.

Wiewiórka ma budowę odpowiednią do trybu życia: jest niewielka (do 25cm.) i bardzo lekka (do 400g). Jak sama nazwa głosi, zwierzątko to ma rude futerko. Ma długi i puszysty ogon. Na uszach ma charakterystyczne pędzelki. W przednich łapkach trzyma jedzenie. Tylne nogi służą do skoków.

Wiewiórka należy do gryzoni. Żyje około 5 lat. Jest samotnikiem, łączy się w pary tylko w okresie godowym. Jest zwierzęciem nadrzewnym, aktywnym w dzień. Ma bardzo dobry węch, słuch i wzrok. Gromadzi jedzenie na zimę. Wiewiórki jedzą orzechy, jagody, nasiona, pędy roślin, a nawet owady. Małe wiewiórki (2-5) rodzą się 2-3 razy do roku. Są ślepe i małeńkie i przez około 2 miesiące matka karmi je mlekiem.





***DZIĘKUJEMY ZA OBEJRZENIE
NASZEJ PREZENTACJI***

Martyna Ragan, Olga Róg i Klaudia Olszowy.

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kolbuszowej

Klasa 6B